

新型コロナワクチンの追加(3回目)接種について

2021年12月16日時点の情報です。
国の方針やワクチンの供給量等により、内容が
変更となる場合があります。

新型コロナウイルスワクチンは、2回接種を受けた場合であっても接種後の時間経過とともに、ワクチンの有効性や免疫原性が低下することが認められていることから、追加(3回目)接種を実施することが国から示されました。

追加接種の概要

新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に
係る自治体説明会資料参考

●対象者

18歳以上で2回の接種を終えた希望者全員

●特に追加接種をおすすめする人

- 1.高齢者、基礎疾患を有する人などの「重症化リスクが高い人」
- 2.重症化リスクが高い人の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い人との接触が多い人」
- 3.医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い人」

●接種時期の目安

2回接種完了から原則8か月経過後

※ただし、地域の感染状況などをふまえて6か月以上経過後に接種することも可能(例外として国が認めた場合に限る)

●接種費用

無料(公費負担)

●接種ワクチン

ファイザー社のワクチン

武田/モデルナ社のワクチン

※追加接種に使用するワクチンは、初回(1回目・2回目)接種に使用したワクチンの種類にかかわらず、メッセンジャーRNA(mRNA)ワクチン(ファイザー社のワクチンまたは武田/モデルナ社のワクチン)を使用することとされています。

●接種体制

初回(1回目・2回目)接種と同様に、**集団接種と個別接種**の併用型で実施予定です。

接種場所や予約方法については、詳細が決まり次第、広報やホームページなどでお知らせします。

※町外のかかりつけ医療機関で接種ができる場合もありますので、町外で接種を希望される場合は、かかりつけの医療機関へご相談ください。


これから初回(1回目・2回目)接種を希望する人へ

- 町内医療機関で接種を実施しています。
- 接種を希望する人は南関町コロナワクチン相談センター(TEL: 0120-671-238)へご連絡ください。

※新たに12歳の誕生日を迎える人については、12歳到達後に順次接種券を発送します。接種券が届いてからの予約をお願いします。

新型コロナワクチン追加(3回目)接種のスケジュール

3回目の接種時期は2回目終了から原則8か月以上経過後



2回接種後に転入した人や海外で接種を受けた人へ

他市区町村で2回接種した後に転入した等により、南関町において接種記録が確認できない場合、追加接種用の接種券(接種券一体型予診票)が自動的には送付されない場合があります。

以下に該当する人は、接種券一体型予診票の発行申請が必要となります。

(詳しくは町ホームページをご覧ください。)

●接種券の発行申請が必要な場合

- ー他市区町村で2回目接種をした後に南関町へ転入した場合
- ー国内で2回接種を終えているがVRS(ワクチン接種記録システム)の登録誤り等により接種記録が確認できない場合
- ー接種券一体型予診票を紛失、滅失、破損等した場合
- ー追加接種用の接種券(接種券一体型予診票)の発行後に南関町へ転入した場合
- ー予診のみで接種券一体型予診票を使用した場合
- ー海外で2回接種した場合*
- ー海外での接種と国内での接種を組み合わせて接種した場合*
- ー海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した場合
- ー在日米軍従事者接種で2回接種した場合*
- ー製薬メーカーの治験等において2回接種した場合*など

※ただし、ファイザー社、武田/モデルナ社またはアストラゼネカ社の新型コロナワクチンを接種している場合に限る



3回目接種に関する送付物について

2021年11月26日(金)に、2021年4月までに2回接種を終えた医療従事者を対象に3回目接種に関する書類を発送しました。

以降は、2回目の接種完了から8か月後の日が近づいた人へ順次発送する予定です。

ご自身が接種可能となる日を確認し、書類が届くまでお待ちください。

(発送スケジュールについては、左ページ「新型コロナワクチン追加(3回目)接種のスケジュール」をご覧ください。)

なんで追加接種をするの?

日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果があり、感染や重症化を予防する効果も確認されています。しかしながら、感染予防効果などは時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが、接種が進んでいる国から報告されるようになりました。特に60歳以上において、2回目接種完了から半年以降で重症例の発生率に上昇傾向が見られたという報告もあります。

このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、海外の状況やワクチンの効果の持続期間の知見をふまえ、2回目の接種完了から原則8か月以上経過した人に、追加接種を実施することとされました。

追加接種の効果や副反応はどのくらい?

3回目接種の効果や副反応について

◎武田/モデルナ社のワクチンの効果や副反応については、改めてお知らせします。

ワクチンの接種量	効 果 ^{※1}	中和抗体価 ^{※2}	副反応
2回目接種と 同量(0.3mL)	入院予防効果 93% 重症化予防効果 92% 死亡に対する予防効果 81% 感染例の発生率 11.3分の1 重症例の発生率 19.5分の1	18歳~55歳 5倍以上 65歳~85歳 11倍以上	2回目と比べ同程度 接種部位の痛み 疲労 頭痛 筋肉痛など

PMDAの審査報告書を元に作成
※1 (予防効果) 2回接種完了後5か月以降に追加接種を受けた場合と追加接種を受けなかった場合を比較
(発 生 率) 60歳以上で追加接種を受けた場合と追加接種を受けなかった場合を比較
※2 2回目接種1か月後と追加接種後1か月後を比較(デルタ株に関して)

ファイザー社のワクチンについては、追加接種を行わなかった場合と比較して、重症化予防効果等を高める効果があります。

副反応に関しては、2回目接種と比較して有害事象の発現傾向は概ね同様であると確認されています。リンパ節の腫れについては、1回目・2回目接種時と比較して発現割合が高い傾向にありますが、ほとんどの場合が軽度であり、発現後短期間で治まっています。

初回(1回目・2回目)接種とは違うワクチンを接種しても大丈夫なの?

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、mRNAワクチンを用いることが適当であるとされています。

追加接種において初回接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用(交互接種)することについて、米国の研究によれば、抗体価の上昇は良好であること、また、副反応に関しては初回接種で報告されたものと同程度であり、交互接種と同種接種で差がなかったことが報告されています。

IgG抗体価 (接種後約2週間後に出現する抗体)

追加接種	初回接種	ファイザー社	武田/モデルナ社
14.9倍			17.3倍
9.7倍			7.9倍

中和抗体価 (抗体のうち、ウイルスの増殖を抑えることができるもの)

追加接種	初回接種	ファイザー社	武田/モデルナ社
20.0倍			31.7倍
11.5倍			10.2倍

(参考資料)
第25回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(令和3年10月28日)提出資料